

**LES REPRESENTATIONS IRREDUCTIBLES COMPLEXES
 DES GROUPES $SL(3,p)$, $PSL(3,p)$**

Erhan Güzel

Résumé. Dans ce travail on obtient toutes les représentations irréductibles complexes des groupes $SL(3, p)$ et $PSL(3, p)$ définis sur le corps \mathbf{Z}_p .

1. Introduction. Les caractères irréductibles complexes des groupes $PSL(2, p); SL(2, q), GL(2, q); GL(3, q), GL(4, q); GL(n, q); SL(3, q), PSL(3, q)$ définis sur le corps $GF(q)$ ($q = p^s$; p premier) ont été étudiés respectivement par Frobenius [4] (1986); Schur [7], Jordan [6] (1907); Steinberg [9] (1951); Green [5] (1955); Simpson et Frame [8] (1973). Drobotenko [3, 4] a obtenu toutes les représentations irréductibles complexes des groupes $GL(3, q)$ et $GL(4, q)$ en 1967 et 1971.

2. Les Représentations Irréductibles Complexes du Groupe $SL(3, p)$.
 Soit $G = SL(3, p)$, considérons les éléments suivants de G :

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

Soient A, B, C les groupes cycliques dont les générateurs sont respectivement a, b, c . Il existe donc les sous-groupes suivants de G :

$$D = A \times B, \quad H = D \cdot C, \quad |D| = p^2, \quad |H| = p^3.$$

Le tableau des caractères irréductibles complexes du groupe H est donné par le tableau 1 [3].

Nous pouvons donner les lemmes suivants:

LEMME 1. Soit $d = (p-1, 3) = 3$, soit g un générateur du groupe multiplicatif \mathbf{Z}_p^x ; $p \equiv 1 \pmod{6}$ et soit $\mathbf{R} = \{\alpha \in \mathbf{Z}_p^x \mid \alpha = g^u, u \equiv 0 \pmod{3}\} \subseteq \mathbf{Z}_p^x$.

$(p-1)^{2/3}$ classes de type \mathbf{C}_5 de H sont incluses respectivement dans les classes $C^{(0)}, C^{(1)}, C^{(2)}*$ de G si, et seulement si, les conditions suivantes sont respectivement vérifiées:

$$X) k \equiv t \pmod{\mathbf{R}}$$

$$Y) (k, t) \in \mathbf{R} \times g\mathbf{R}; (k, t) \in g\mathbf{R} \times g^2\mathbf{R}; (k, t) \in g^2\mathbf{R} \times \mathbf{R}$$

$$Z) (k, t) \in \mathbf{R} \times g^2\mathbf{R}; (k, t) \in g\mathbf{R} \times \mathbf{R}; (k, t) \in g^2\mathbf{R} \times g\mathbf{R}.$$

$k, t = 1, \dots, p-1$

Classes d'équivalence de H	Représentant de la Classe	Nombre de Classes	Nombre d'éléments de la Classe	$\psi_{h,r}; h \neq 0$		$\psi_{m,n}$
				$\epsilon^p = 1;$ $h, r = 0, \dots, p-1$	$\epsilon^p = 1;$ $m, n = 0, \dots, p-1$	
\mathbf{C}_1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	1	1	p		1
\mathbf{C}_2	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$p-1$	1	$p\epsilon^{kh}$		1
\mathbf{C}_3	$\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$p-1$	p	0		ϵ^{km}
\mathbf{C}_4	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & t \\ 1 \end{bmatrix}$	$p-1$	p	0		ϵ^{tn}
\mathbf{C}_5	$\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & t \\ 1 \end{bmatrix}$	$(p-1)^2$	p	0		ϵ^{km+tn}

LEMME 2. Soit $d = 3$, soient $x, y \in \{1, \dots, p-1\}$; $x \equiv g^u \pmod{p}$, $y \equiv g^v \pmod{p}$

- 1) Si $x \equiv y \pmod{p}$ et $u \equiv v \pmod{3}$, le nombre de couples (x, y) solutions de la congruence $x + y \equiv 0 \pmod{p}$ est $p-1$.
- 2) Le nombre de couples (x, y) solutions de la congruence $x + y \equiv 1 \pmod{p}$ est $p-2$.

*[1] $C^{(0)}, C^{(1)}, C^{(2)}$ sont les classes d'équivalence dont les représentants sont respectivement
 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & g & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & g^2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

3) Si $u \equiv v \pmod{3}$, le nombre de couples (x, y) solutions de la congruence $x + y \equiv 1 \pmod{p}$ est $(p - 4)/3$.

4) Si $u \equiv v \pmod{3}$, le nombre de couples $(x, y) = (y, x)$ solutions de la congruence $x + y \equiv 1 \pmod{p}$ est $(p - 1)/3$.

5) Dans les cas 2), 3), 4) en replacant la congruence $x + y \equiv 1 \pmod{p}$ par la congruence $x + y \equiv g^i \pmod{p}$ ($i = 1, \dots, p - 1$) le nombre de couples (x, y) solutions ne change pas.

Considérons maintenant les caractères irréductibles complexes du groupe $G = SL(3, p)$ [8]:

$$\begin{aligned} d &= 1, 3, \xi_i^{(j)}; j = 1, \dots, 11, i = 1, \dots, t_j; \\ t_1 &= t_2 = t_4 = 1, t_3 = t_5 = p - 2, t_6 = [(p - 1)(p - 4) + 3 - d]/6, t_7 = p(p - 1)/2, \\ t_8 &= (p^2 + p + p + 1 - d)/3, t_9 = t_{10} = t_{11} = (d - 1)3/2. \end{aligned}$$

Soit $\xi_{iH}^{(j)} = \xi^{(j)}$. Les valeurs de $\xi^{(j)}$ sur les classes de H sont données par le tableau 2.

Soit $\beta = \varepsilon^{km+tn}; \varepsilon^p = 1$; $k, t, m, n = 1, \dots, p - 1$. Si le couple (k, t) vérifie la condition X (ou Y ou Z), nous écrivons $(k, t) \in X$ (ou $\in Y$ ou $\in Z$). Soient

$$x = \sum_{(k,t) \in X} \beta, \quad y = \sum_{(k,t) \in Y} \beta, \quad z = \sum_{(k,t) \in Z} \beta$$

Si $d = 3$, nous pouvons trouver le nombre de fois que $\xi_i^{(j)}$ ($j = 9, 10, 11$; $i = 0, 1, 2$) est contenu dans le caractère induit $\psi_{m,n}^G$:

D'après le tableau 1. le tableau 2, le théorème de Frobenius et le lemme 1:

$$\begin{aligned} (\psi_{m,n}^G \xi_i^{(j)}) &= p^{-3}[(p^3 - p)/3 + (p\delta_{oh} - (p - 1)/3)px + (p\delta_{1h} - (p - 1)/3)py + \\ &\quad + (p\delta_{2h} - (p - 1)/3)pz]^{(*)} \end{aligned}$$

Si nous prenons $m \equiv g^u \pmod{p}$ et $n \equiv g^v \pmod{p}$, d'après le lemme 2

$$u \equiv v \pmod{3} \Rightarrow x = (2p + 1)/3, y = z = -(p - 1)/3$$

$$(u, v) \equiv_3 (0, 2), (1, 0), (2, 1)^{*} \Rightarrow x = z = -(p - 1)/3, y = (2p + 1)/3$$

$$(u, v) \equiv_3 (0, 1), (1, 2), (2, 0) \Rightarrow x = y = -(p - 1)/3, z = (2p + 1)/3$$

Ainsi, la décomposition de $\xi^{(j)}$ ($j = 1, \dots, 11$) en somme de caractères irréductibles de H peut s'écrire comme ci dessous:

$$\begin{aligned} d &= 1, 3 \\ \xi^{(1)} &= \psi & \xi^{(6)} &= (p + 2)S_3 + 3S_4 + S_0 + S_1 + S_2 + 6\psi \\ (1) \quad \xi^{(2)} &= S_3 + S_4 + 2\psi & \xi^{(7)} &= pS_3 + S_4 + S_0 + S_1 + S_2 \end{aligned}$$

$$(*)\delta_{ih} = \begin{cases} 1; & i = h \\ 0; & i \neq h \end{cases}$$

$$(*) (u, v) \equiv_3 (a, b) \Leftrightarrow u \equiv a \pmod{3}, v \equiv b \pmod{3}$$

	$\xi^{(1)}$	$\xi^{(2)}$	$\xi^{(3)}$	$\xi^{(4)}$	$\xi^{(5)}$	$\xi^{(6)}$	$\xi^{(7)}$	$\xi^{(8)}$	$\xi^{(9)}$	$\xi^{(10)}$	$\xi^{(11)}$
Représentant de la Classe	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	1	$p(p+1)$	p^2+p+1	p^3	$p(p^2+p+1)$	$(p+1)^2$	$(p-1)^2$	$(p+1)$	$(p-1)^2$	$(p-1)^2$
C_1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	1	$p(p+1)$	p^2+p+1	p^3	$p(p^2+p+1)$	$(p+1)^2$	$(p-1)^2$	$(p+1)$	$(p-1)^2$	$(p-1)^2$
C_2	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	1	0	$p+1$	0	p	$2p+1$	-1	$-(p-1)$	$(2p+1)/3$	$-(p-1)/3$
C_3	$\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	1	0	$p+1$	0	p	$2p+1$	-1	$-(p-1)$	$(2p+1)/3$	$-(p-1)/3$
C_4	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	1	0	$p+1$	0	p	$2p+1$	-1	$-(p-1)$	$(2p+1)/3$	$-(p-1)/3$
C_5	$\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	1	1	0	1	0	1	0	1	1	$p\delta_{ih}^-$
										$-\frac{p\delta_{ih}^-}{(p-1)/3}$	$-\frac{p\delta_{ih}^-}{(p-1)/3}$

$$i, h = 0, 1, 2$$

$$\begin{aligned}
\xi^{(3)} &= S_3 + S_4 + 3\psi & \xi^{(8)} &= (p-1)S_3 + S_0 + S_1 + S_2 \\
\xi^{(4)} &= pS_3 + S_4 + S_0 + S_1 + S_2 + \psi & \xi_{iH}^{(9)} &= (p-1)/3 \cdot S_3 + S_4 + S_i + 3\psi; \\
&&& ; i = 0, 1, 2 \\
\xi^{(5)} &= (p+1)S_3 + 2S_4 + S_0 + S_1 + S_2 + 3\psi & \xi_{iH}^{(10)} &= \xi_{iH}^{(11)} = (p-1)/3 \cdot S_3 + S_i
\end{aligned}$$

Ici

$$\begin{aligned}
\psi &= \psi_{0,0} \\
S_0 &= \sum_m \sum_n \psi_{m,n}; & u \equiv v \pmod{3} \\
S_1 &= \sum_m \sum_n \psi_{m,n}; & (u, v) \equiv_3 (0, 2), (1, 0), (2, 1) \\
S_2 &= \sum_m \sum_n \psi_{m,n}; & (u, v) \equiv_3 (0, 1), (1, 2), (2, 0) \\
S_3 &= \sum_{i=1}^{p-1} \Phi_i^H; & S_4 &= \sum_{m,n} (\psi_{m,n} + \psi_{0,n}) \\
(m, n &= 1, \dots, p-1; m \equiv g^u \pmod{p}, n \equiv g^v \pmod{p})
\end{aligned}$$

D'après le théorème de Frobenius et (1):

$$\begin{aligned}
d &= 1, 3 \\
\psi_{m,0}^G &= \psi_{0,n}^G = \sum_{i=1}^{t_2} \xi_i^{(2)} + \sum_{i=1}^{t_3} \xi_i^{(3)} + \sum_{i=1}^{t_4} \xi_i^{(4)} + 2 \sum_{i=1}^{t_5} \xi_i^{(5)} + 3 \sum_{i=1}^{t_6} \xi_i^{(6)} + \sum_{i=1}^{t_7} \xi_i^{(7)} + \\
&\quad + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{i=1}^2 \xi_i^{(9)} \\
\xi_{m,n}^G &= \sum_{i=1}^{t_4} \xi_i^{(4)} + \sum_{i=1}^{t_5} \xi_i^{(5)} + \sum_{i=1}^{t_6} \xi_i^{(6)} + \sum_{i=1}^{t_7} \xi_i^{(7)} + \sum_{i=1}^{t_8} \xi_i^{(8)} + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{j=9}^{11} \xi_j^{(j)}; \\
&\quad u \equiv v \pmod{3} \\
\xi_{m,n}^G &= \sum_{i=1}^{t_4} \xi_i^{(4)} + \sum_{i=1}^{t_5} \xi_i^{(5)} + \sum_{i=1}^{t_6} \xi_i^{(6)} + \sum_{i=1}^{t_7} \xi_i^{(7)} + \sum_{i=1}^{t_8} \xi_i^{(8)} + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{j=9}^{11} \xi_j^{(j)}; \\
&\quad (u, v) \equiv_3 (0, 2), (1, 0), (2, 1) \\
\psi_{m,n}^G &= \sum_{i=1}^{t_4} \xi_i^{(4)} + \sum_{i=1}^{t_5} \xi_i^{(5)} + \sum_{i=1}^{t_6} \xi_i^{(6)} + \sum_{i=1}^{t_7} \xi_i^{(7)} + \sum_{i=1}^{t_8} \xi_i^{(8)} + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{j=9}^{11} \xi_j^{(j)}; \\
&\quad (u, v) \equiv_3 (0, 1), (1, 2), (2, 0) \\
(m, n &= 1, \dots, p-1; m \equiv g^u \pmod{p}, n \equiv g^v \pmod{p})
\end{aligned}$$

Soit $M_i^{(j)}$ le KG modul(*) irréductible de caractère $\xi_i^{(j)}$ et soit $M_{m,n}$ le KG -modul de caractère $\psi_{m,n}^G$. D'après (2):

$$\begin{aligned}
 d &= 1, 3 \\
 M_{m,0} = M_{0,n} &= \sum_{i=1}^{t_2} M_i^{(2)} + \sum_{i=1}^{t_3} M_i^{(3)} + \sum_{i=1}^{t_4} M_i^{(4)} + 2 \sum_{i=1}^{t_5} M_i^{(5)} + 3 \sum_{i=1}^{t_6} M_i^{(6)} + \\
 (3) \quad &\quad + \sum_{i=1}^{t_7} M_i^{(7)} + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{i=0}^2 M_i^{(9)} \\
 M_{m,n} &= \sum_{j=4}^8 \sum_{i=1}^{t_j} M_i^{(j)} + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{j=9}^{11} M_0^{(j)}; \quad u \equiv v \pmod{3} \\
 M_{m,n} &= \sum_{j=4}^8 \sum_{i=1}^{t_j} M_i^{(j)} + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{j=9}^{11} M_1^{(j)}; \quad (u, v) \equiv_3 (0, 2), (1, 0), (2, 1) \\
 M_{m,n} &= \sum_{j=4}^8 \sum_{i=1}^{t_j} M_i^{(j)} + \left(\frac{d-1}{2}\right) \sum_{j=9}^{11} M_2^{(j)}; \quad (u, v) \equiv_3 (0, 1), (1, 2), (2, 0) \\
 &\quad (m, n = 1, \dots, p-1; \quad m \equiv g^u \pmod{p}, \quad n \equiv g^v \pmod{p})
 \end{aligned}$$

Si $\xi_i^{(j)}(1) = n_i^{(j)}$, $e_i^{(j)} = n_i^{(j)} | G |^{-1} \sum_{a \in G} \xi_i^{(j)}(a^{-1})a$ est l'idempotente centrale de KG . D'après (3):

$$d = 1, 3$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad e_j^{(j)} M_{m,0} &= e_i^{(j)} M_{0,n} = M_i^{(j)}; \quad j = 2, 3, \quad i = 1, \dots, t_j \\
 e_i^{(j)} M_{m,n} &= M_i^{(j)}; \quad j = 4, \dots, 8, \quad i = 1, \dots, t_j \\
 e_0^{(j)} M_{m,n} &= M_0^{(j)}; \quad j = 9, 10, 11; \quad u \equiv v \pmod{3} \\
 e_1^{(j)} M_{m,n} &= M_1^{(j)}; \quad j = 9, 10, 11; \quad (u, v) \equiv_3 (0, 2), (1, 0), (2, 1) \\
 e_2^{(j)} M_{m,n} &= M_2^{(j)}; \quad j = 9, 10, 11; \quad (u, v) \equiv_3 (0, 1), (1, 2), (2, 0) \\
 &\quad (m, n = 1, \dots, p-1; \quad m \equiv g^u \pmod{p}, \quad n \equiv g^v \pmod{p}).
 \end{aligned}$$

Si $e_{m,n}$ est l'idempotente centrale du caractère $\psi_{m,n}$ de H , on a $M_{m,n} = \mathbf{K}Ge_{m,n}$. Alors, d'après (4):

$$d = 1, 3$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad M_i^{(j)} &= \mathbf{K}Ge_i^{(j)}e_{m,0}; \quad j = 2, 3, \quad i = 1, \dots, t_j \\
 M_i^{(j)} &= \mathbf{K}Ge_i^{(j)}e_{0,n}; \quad j = 4, \dots, 8, \quad i = 1, \dots, t_j \\
 M_0^{(j)} &= \mathbf{K}Ge_0^{(j)}e_{m,n}; \quad j = 9, 10, 11, \quad u \equiv v \pmod{3}
 \end{aligned}$$

(*) K est le corps des nombres complexes

$$\begin{aligned} M_1^{(j)} &= \mathbf{K}Ge_1^{(j)}e_{m,n}; \quad j = 9, 10, 11, (u, v) \equiv_3 (0, 2), (1, 0), (2, 1) \\ M_2^{(j)} &= \mathbf{K}Ge_2^{(j)}e_{m,n}; \quad j = 9, 10, 11, (u, v) \equiv_3 (0, 1), (1, 2), (2, 0) \\ &(m, n = 1, \dots, p-1; \quad m \equiv g^u \pmod{p}, \quad n \equiv g^v \pmod{p}) \end{aligned}$$

Ainsi, on a démontré le théorème suivant:

THÉORÈME. *Le $\mathbf{K}G$ -modul du caractère irréductible $\xi_i^{(j)}$ du groupe $G = SL(3, p)$ est comme ci-dessous:*

$$\begin{aligned} d &= 1, 3 \\ \mathbf{K}Ge_i^{(j)}e_{m,0} &= \mathbf{K}Ge_i^{(j)}e_{0,n}; \quad j = 2, 3, \quad i = 1, \dots, t_j \\ \mathbf{K}Ge_i^{(j)}e_{m,n}; \quad j &= 4, \dots, 8, \quad i = 1, \dots, t_j \\ \mathbf{K}Ge_0^{(j)}e_{m,n}; \quad j &= 9, 10, 11, \quad u \equiv v \pmod{3} \\ \mathbf{K}Ge_1^{(j)}e_{m,n}; \quad j &= 9, 10, 11, \quad (u, v) \equiv_3 (0, 2), (1, 0), (2, 1) \\ \mathbf{K}Ge_2^{(j)}e_{m,n}; \quad j &= 9, 10, 11, \quad (u, v) \equiv_3 (0, 1), (1, 2), (2, 0) \\ &(m, n = 1, \dots, p-1; \quad m \equiv g^u \pmod{p}, n \equiv g^v \pmod{p}) \end{aligned}$$

3. Les Représentations Irréductibles Complexes du Groupe

$PSL(3, p)$. Si nous écrivons $G = SL(3, p)$ et $PG = PSL(3, p)$, nous avons $PG = G/Z(G)$.^(*) Les caractères irréductibles $\xi_i^{(j)}$ du groupe G qui vérifient la condition suivante sont les caractères irréductibles du groupe PG :

$$\xi_i^{(j)}(a) = \xi_i^{(j)}(1); \quad a \in Z(G).$$

Alors, les caractères irréductibles du groupe $PSL(3, p)$ sont comme ci-dessous [8]:

$$\begin{aligned} d &= 1, 3, \xi_i^{(j)}; \quad j = 1, \dots, 9, \quad i = 1, \dots, t'_j; \\ t'_1 &= t'_2 = t'_4 = 1, \quad t'_3 = t'_5 = (p-4)/3, \quad t'_6 = (p^2 - 5p + 4)/18, \\ t'_7 &= [p^2 - p + 3(d-3)]/6, \quad t'_8 = (p^2 + p - 2)/9, \quad t'_9 = (d-1)3/2 \end{aligned}$$

D'autre part, pour le groupe H considéré à § 2, $H \cap Z(G) = \{I\}$. Le groupe H est donc isomorphe à un sous-groupe de PG .

Alors, si nous prenons PG au lieu de G , pour $j = 2, \dots, 9$ (1), (2), (3), (4), (5) et le théorème ne changent pas.

REFERENCES

- [1] L. Dickson, *Linear Groups*, Dover, New York, 1958.
- [2] E. S. Drobotenko, *Irreducible complex representations of the group $GL(3, q)$* , Dopovidi Akad. Nauk Ukrains. RSR. Ser. A (1967), 104–109.

^(*) $Z(G)$ est le centre du groupe G

- [3] E. S. Drobotenko, *Irreducible complex representations of the group $GL(4, q)$* , Dopovidi Akad. Nauk Ukrains. RSR. Ser. A (1971), 397–399, 476.
- [4] G. Frobenius, *Über Gruppen Charaktere*, Berliner Sitz. 1896.
- [5] J. A. Green, *Characters of the finite general groups*, Trans. Amer. Math. Soc. **80** (1955), 407–477.
- [6] H. Jordan, *Group-characters of various types of linear groups*, Amer. J. Math. **29** (1907), 397.
- [7] I. Schur, *Untersuchungen Über die Darstellung der Endlichen Gruppen durch Gebrochene Lineare Substitutionen*, J. für Math. **132** (1907), 85.
- [8] W. A. Simpson and J. S. Frame, *The character tables for $SL(3, q)$, $SU(3, q^2)$, $PSL(3, q)$, $PSU(3, q^2)$* , Cand. J. Math. **25** (1973), 486–494.
- [9] R. Steinberg, *The representations of $GL(3, q)$, $GL(4, q)$, $PGL(3, q)$ and $PGL(4, q)$* , Cand. J. Math. **3** (1951), 225–235.

Department de Mathématiques
 Université d'Istanbul
 34459 Vezneciler, Istanbul
 Turquie

(Received 25. 02. 1987)