

НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

И. М. Лаврентьев, Р. Шћепановић

Резюме. Рассматривается вопрос разрешимости уравнения $F(x) = 0$, где F монотонный и G вполне непрерывный операторы в H .

Пусть в вещественном сепарабельном гильбертовом пространстве H задан дифференцируемый по Гато вещественный функционал $f(x)$. Положим $F(x) = \text{grad } f(x)$. Пусть $\{H_n\}$ последовательность конечномерных подпространств H , таких что $H_n \subset H_{n+1}$ в $\overline{\bigcup H_n} = H$.

Определение. 1. Отображение $F : H \rightarrow H$ называется: монотонным если

$$(\forall x, y \in H)((F(x) - F(y), x - y) \geq 0); \quad (1)$$

строго монотонным, если равенство (1) возможно лишь тогда когда $x = y$.

Определение 2. Отображение $F : H \rightarrow H$ называется: вполне непрерывным, если оно непрерывно и компактно; усилено непрерывным если оно преобразует всякую слабо сходящуюся последовательность в сходящуюся последовательность.

Браудер [1] рассматривал вопрос разрешимости уравнения $F(x) + G(x) = 0$, где $F + G$ монотонный и G усилено непрерывный оператор.

Пусть $D_R = \{u \in H : \|u\| \leq R, R > 0\}$ и ∂D_R граница от D_R .

ТЕОРЕМА 1. Пусть выполнены условия:

- (1) $f(x)$ выпуклый функционал на H ,
- (2) $F : H \rightarrow H$ геминепрерывный оператор,
- (3) $G : H \rightarrow H$ вполне непрерывный оператор,
- (4) $\exists r > 0)(f(x) + (x, G(y)) > f(0)$, если $x \in \partial D_r$ и $y \in D_r$,

$$(5) (\exists k > 0)(\forall x, y \in H)(\|G(x) - G(y)\| \leq k\|F(x) - F(y)\|).$$

$$\text{Тогда } (\exists x_0 \in H)(F(x_0 + G(x_0)) = 0).$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ и $x, y \in H$. Рассмотрим функционал

$$\varphi(x, y) = \varepsilon\|x\|^2 + f(x) + (x, G(y)) \quad (2)$$

Для фиксированного y функционал (2) слабо полунепрерывен снизу по x (ибо $\varphi(x, y)$ строго выпуклый функционал по x). Так как

$$\varphi(x, y) - \varphi(x, 0) = f(x) + (x, G(y)) - f(0) > 0, \text{ если } x \in \partial D_r \text{ и } y \in D_r,$$

то для любого $y \in D_r$ существует единственная точка $x = V(y) \in D_r$ абсолютного минимума функционала (2) по x . Следовательно

$$(\forall y \in D_r)(\exists! V(y) \in D_r)(\forall x \in D_r)(\varphi(V(y), y) \leq \varphi(x, y)),$$

т.е. $V : D_r \rightarrow D_r$.

Пусть P_n оператор ортогонального проектирования из H в H_n . Очевидно, отображение $P_n V : D_r \rightarrow D_r$ непрерывно. Сходно теореме Брауэра следует $(\exists y_n \in D_r)(P_n V(y_n) = y_n)$. Так как последовательность $\{y_n\}$ ограничена, то $y_{n_k} \rightharpoonup y_0$ и $V(y_{n_k}) \rightharpoonup v_0$. Следовательно

$$\begin{aligned} (v_0, h) &= \lim_{k \rightarrow \infty} (v_0, P_{n_k} h) = \lim_{k \rightarrow \infty} (V(y_{n_k}), P_{n_k} h) = \lim_{k \rightarrow \infty} (P_{n_k} V(y_{n_k}), h) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (y_{n_k}, h) = (y_0, h), \quad h \in H, \end{aligned}$$

т.е. $v_0 = y_0$ и $V(y_{n_k}) \rightharpoonup y_0$.

Покажем что $V(y_{n_k}) \rightarrow y_0$. Пусть $L(x) = 2\varepsilon x + F(x)$. Так как $L(V(y_{n_k})) = -G(y_{n_k})$, то множество $\{L(V(y_{n_k}))\}$ компактно. Отсюда следует, что подпоследовательность $\{L(V(y_{n_k}))\}$ сильно сходится. Далее

$$(L(V(y_{n_k+p})) - L(V(y_{n_k})), V(y_{n_k+p}) - V(y_{n_k})) \geq 2\varepsilon\|V(y_{n_k+p}) - V(y_{n_k})\|^2.$$

Отсюда следует, что $\{V(y_{n_k})\}$ фундаментальная подпоследовательность, т.е. $V(y_{n_k}) \rightarrow y_0$.

Осталось показать, что $y_{n_k} \rightarrow y_0$. Действительно,

$$\begin{aligned} \|P_{n_k} V(y_{n_k}) - y_0\|^2 &= \|P_{n_k} V(y_{n_k})\|^2 - 2(P_{n_k} V(y_{n_k}), y_0) + \|y_0\|^2 \leq \|V(y_{n_k})\|^2 - \\ &- 2(V(y_{n_k}), P_{n_k} y_0) + \|y_0\|^2 = \omega(y_{n_k}). \end{aligned}$$

Так как $\omega(y_{n_k}) \rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$, то из $P_{n_k} V(y_{n_k}) = y_{n_k}$ следует $y_{n_k} \rightarrow y_0$.

Из предельного перехода в $\varphi(V(y_{n_k}), y_{n_k}) \leq \varphi(x, y_{n_k})$, $x \in H$, получаем $\varphi(y_0, x_0) \leq \varphi(x, y_0)$, $x \in H$, т.е. $2\varepsilon y_0 + F(y_0) + G(y_0) = 0$.

Пусть $\varepsilon_n > 0$, $\varepsilon_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. Тогда

$$(\forall n \in N)(\exists y_n \in D_r)(2\varepsilon_n y_n + F(y_n) + G(y_n) = 0). \quad (3)$$

Из последовательности $\{y_n\}$ можно выделить последовательность $\{y_{n_k}\}$ такую что $y_{n_k} \rightharpoonup x_0$. Так как множество $\{L(y_{n_k})\}$ компактно то последовательность $\{F(y_{n_k})\}$ сильно сходится. Пусть $F(y_{n_k}) \rightarrow z_0$. Для $y \in H$ имеем

$$\begin{aligned} (F(y) - z_0, y - y_0) &= \lim_{k \rightarrow \infty} (f(y) - F(y_{n_k}), y - x_0) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (F(y) - F(y_{n_k}), y - y_{n_k}) \geq 0, \text{ т.е. } (\forall y \in H)((F(y) - z_0, y - x_0) \geq 0). \end{aligned}$$

Отсюда следует $z_0 = F(x_0)$, $F(y_{n_k}) \rightarrow F(x_0)$. Из $\|G(y_{n_k}) - G(x_0)\| \leq K\|F(y_{n_k}) - F(x_0)\|$ следует $G(y_{n_k}) \rightarrow G(x_0)$. Из предельного перехода в (3) (n заменит с n_k) получаем $F(x_0) + G(x_0) = 0$. Теорема доказана.

В следующей теореме не предполагается что F потенциальный оператор.

ТЕОРЕМА 2. Пусть; (1) F монотонный оператор из h в H ;

(2) $(\exists r > 0)((F(x) + G(y), x) \geq 0, \text{ если } y \in D_r \text{ и } x \in \partial D_r)$;

(3) F непрерывный и G вполне непрерывный операторы из H в H ;

(4) $\exists K > 0(\forall x, y \in H)(\|G(x) - G(y)\| \leq K\|F(x) - F(y)\|)$;

Тогда $(\exists x_0 \in H)(F(x_0) + G(x_0) = 0)$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ и $B(x, y) = \varepsilon x + F(x) + G(y)$; $x, y \in H$. Далее $(\forall y \in D_r)(\forall x \in \partial D_r)((B(x, y), x) > 0$. Следовательно, для $y \in D_r$ существует единственная точка $x = V(y) \in D_r$ такая что $B(x, y) = 0$, т.е. $\varepsilon V(y) + F(V(y)) + G(y) = 0$. Как и в теореме 1 показывается что существует последовательность $\{y_n\}$ такая что $V(y_n) \rightarrow y_0$ и $y_n \rightarrow y_0$. Из предельного перехода в $\varepsilon V(y_n) + F(V(y_n)) + G(y_n) = 0$ получаем $\varepsilon y_0 + F(y_0) + G(y_0) = 0$. Окончание доказательства проводится как и в предыдущей теореме. Теорема доказана.

Определение 3. Скажем, что отображение $P : H \rightarrow H$ удовлетворяет условию (α) если образ каждого некомпактного множества – некомпактное множество.

Определение 4. Скажем, что функционал $\psi(x, y)$, $x, y \in H$ удовлетворяет условию (β) на H , если из $x_1 \neq x_2 (x_1, x_2 \in H)$ и $\psi(x_1, y) = \psi(x_2, y)$ следует $(\exists x' \in H)(\psi(x', y) \leq \psi(x_i, y), i = 1, 2)$.

Замечание 1. Утверждение теоремы 1 сохраняется при замене условия (1), (2) и (5) условиями; (а) F удовлетворяет условию (α) ; (б) функционал $f(x) + (x, G(y))$ обладает свойством (β) на H ; (в) $f(x)$ слабо полунепрерывен снизу на H ; (г) F непрерывное отображение из H в H .

Действительно, достаточно рассмотреть функционал $\varphi(x, y) = f(x) + (x, G(y))$. Для любого $y \in D_r$ функционал $\varphi(x, y)$ имеет единственную точку $x = V(y) \in D_r$ абсолютного минимума по x . Далее, показывается, что существует последовательность $\{y_n\}$ такая что

$$F(y_n) + G(y_n) = 0 \tag{4}$$

Отсюда следует, что множество $\{F(y_n)\}$ компактно, т.е. последовательность $\{y_n\}$ сильно сходится. Пусть $y_n \rightarrow x_0$. Из предельного перехода в (4) получим $F(x_0) + G(x_0) = 0$.

Замечание 2. В [2, §§18.2] доказано утверждение (γ): Пусть хеминепрерывный монотонный оператор S из H в H удовлетворяет условию: существует $r > 0$ такое, что $(S(x), x) > 0$ если $\|x\| > r$. Тогда существует решение уравнения $S(x) = 0$. Если $S = F + G$, F строго монотонный оператор, то утверждение (γ) не верно. Действительно, пусть $F = A$ линейный самосопряженный оператор из H в $R(A) \subset H$; $(Ax, x) > 0$, $x \neq 0$ и $R(A) \neq H$. Тогда существует $g \notin H \setminus R(A)$. Пусть $S(x) = Ax + (1 - \|x\|^2)g$. Следовательно для $\|x\| = 1$ имеем $(S(x), x) > 0$. Предположим, что существует x_0 , $\|x_0\| < 1$ такое что $S(x_0) = 0$, т.е. $Ax_0 = (\|x_0\|^2 - 1)g$. Отсюда вытекает, что $Ay_0 = g$, где $y_0 = x_0(\|x_0\|^2 - 1)$, что невозможно.

Замечание 3. Условие (4) теоремы 1 будет выполнено, например, если: $f(x) \geq \alpha\|x\|^2$, $\alpha > 0$, $x \in H$; $\|G(x)\| \leq \beta(\|x\|)$, где β убывающая неотрицательная функция на $[0, \infty)$. Действительно, так как $f(x) + (x, G(y)) \geq \alpha\|x\|^2 - \|x\|\beta(\|y\|)$, то для $\|x\| = r$ и $\|y\| \leq r$ имеем $f(x) + (x, G(y)) \geq \alpha r^2 - r \cdot \beta(r)$. Очевидно можно выбрать $r > 0$ такое что $\alpha r^2 - r\beta(r) > f(0)$.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] F. E. Browder, *Nonlinear elliptic boundary value problems*, Bull. Amer. Math. Soc. **69** (1963).
- [2] М. М. Вайнберг, *Вариационный метод монотонных операторов*, Наука, Москва, 1972.

МГУ, Механико-математический факультет
Кафедра математического анализа
Москва, СССР

(Поступила 09 05 1984)

Универзитет "В. Влаховић"
Институт за математику и физику
81000 Титоград
Југославија